

Употреба

Преходното мляко Novalac 2 е подходящо за кърмачета след навършване на шестмесечна възраст. То е част от разнообразното хранене и не трябва да се използва като заместител на майчиното мляко през първите шест месеца от живота. Подходящо е за дохранване, ако кърмата е недостатъчна. Решението да започнете дохранване, включително всички изключения до шестмесечна възраст, се взема единствено след препоръка на медицински, фармацевтичен, хранителен или друг специалист, който отговаря за грижата за майката и новороденото и като се вземат предвид индивидуалните специални нужди, свързани с растежа и развитието на кърмачето. Novalac 2 е част от широк асортимент от продукти, разработени съобразно хранителните потребности на кърмачетата. За деца, по-големи от 12 месеца, препоръчваме преминаване на мляко за деца Novalac 3.

Важна информация

Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета.

Преходното мляко Novalac 2 се използва само по препоръка на лекар, фармацевт или друг здравен специалист в областта на грижите за майката и новороденото. Когато се използва преходно мляко Novalac 2, е необходимо специално внимание при кърмачета с отслабен имунен отговор, недоносени кърмачета и новородени с ниско телесно тегло при раждане и в случай на алергични реакции към белтъците на млякото. Неправилно приготвяне или съхранение може да породи риск за здравето на детето. При хранене от шише се уверете, че контактът между млякото и зъбите на кърмачето не е твърде продължителен или прекалено чест, понеже това увеличава вероятността от развитие на кариес. Винаги четкайте зъбите на кърмачето след последното нощно хранене.

Дозировка

Възраст на кърмачето (месеци)	6-12
Брой хранения на ден	3*
Брой лъжички за приготвяне на едно хранене	7
Количество вода (ml)	210

* Като част от разнообразен хранителен режим

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,3 g Novalac 2. Разтворете една лъжичка в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен ако лекарят, не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

- Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина.
- Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия.
- След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици.

Затваряйте кутията плътно след употреба.
- Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.

Опаковано при контролирани атмосферни условия.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария

Произведени в ЕС

Официален представител за България: Медис Фарма България ЕООД,
София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31

MEDIS | www.novalac.bg



Novalac

2

Преходно мляко
за кърмачета



6-12 месеца

400 g e

Хранителна стойност

	100 g	100 ml
Енергийна стойност		
	kJ	2115
	kcal	505
	g	25
Мазнини		
От които		
- наситени	g	11,6
- Линолова киселина	g	4,6
- Алфа-линоленова киселина	mg	410
- DHA (Докозахеасенова киселина)	mg	120
Белтъци	g	60
От които захари	g	42
Белтъци	g	9,5
Витамини		
Витамин А	µg	440
Витамин D	µg	12
Витамин E	mg	8
Витамин K	µg	60
Витамин C	mg	60
Витамин B1 (Тиамин)	mg	0,8
Витамин B2 (Рибофлавин)	mg	1,05
Ниацин	mg	4,5
Витамин B6	mg	0,5
Фолиева киселина	µg	110
Фолат	µg-DFE	190
Витамин B12	µg	1,5
Биотин	µg	18
Пантотенова киселина	mg	5
Минерали		
Натрий	mg	165
Калий	mg	600
Хлорид	mg	390
Калций	mg	500
Фосфор	mg	300
Магний	mg	45
Желязо	mg	7,8
Цинк	mg	3,7
Мед	mg	0,38
Манган	mg	0,045
Флуорид	mg	<0,45
Селен	µg	25
Йод	µg	95
L-карнитин	mg	20

Съставки

Обезмаслено мляко, малтодекстрини, растителни масла (палмово, соево, кокосово), млечни протеини, лактоза, калиеви соли на лимонена киселина, **рибено** масло (DHA) (мляко), калиев хлорид, калиеви соли на лимонена киселина, емулгатор (соев лецитин), натриева сол на ортофосфорна киселина, калиева сол на ортофосфорна киселина, L-фенилаланин, витамини (аскорбинова киселина, натриев-L-аскорбат, D-алфа токоферол ацетат, калиев D-пантотенат, никотинамид, тиамин хидрохлорид, рибофлавин, ретинол ацетат, пиридоксин хидрохлорид, фолиева киселина, фитомедацион, холекалциферол, D-биотин, цианокобаламин), магнезиеви соли на лимонена киселина, L-триптофан, L-изолеуцин, железен сулфат, L-цистин, L-тирозин, L-карнитин, L-левцин, натриев хлорид, цинков сулфат, антиоксиданти (екстракт, богат на токоферол), натриев селенит, меден сулфат, калиев йодид, манганов сулфат.

Инструкции за приготвяне



МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНО.



1 Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с биберона във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



2 Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



3 Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето.



4 С приложената в кутията мерителна лъжичка, сложете препоръчания брой лъжички от млякото за кърмачета или малкото дете в шишето.



5 Затворете шишето и го разклатете добре, така че прахообразната съставка да се разтвори изцяло.



6 Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.