Употреба

Преходното мляко Novalac 2 е подходящо за кърмачета след навършване на шестмесечна възраст. То е част от разнообразното хранене и не трябва да се използва като заместител на майчиното мляко през първите шест месеца от живота. Подходящо е за дохранване, ако кърмата е недостатъчна. Решението да започнете дохранване, включително всички изключения до шестмесечна възраст, се взема единствено след препоръка на медицински, фармацевтичен, хранителен или друг специалист, който отговаря за грижата за майката и новороденото и като се вземат предвид индивидуалните специални нужди, свързани с растежа и развитието на кърмачето. Novalac 2 е част от широк асортимент от продукти, разработени съобразно хранителните потребности на кърмачетата. За деца, по-големи от 12 месеца, препоръчваме преминаване на мляко за деца

Важна информация

Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета.

Преходното мляко Novalac 2 се използва само по препоръка на лекар, фармацевт или друг здравен специалист в областта на грижите за майката и новороденото. Когато се използва преходно мляко Novalac 2, е необходимо специално внимание при кърмачета с отслабен имунен отговор, недоносени кърмачета и новородени с ниско телесно тегло при раждане и в случай на алергични реакции към белтъците на млякото. Неправилно приготвяне или съхранение може да породи риск за здравето на детето. При хранене от шише се уверете, че контактът между млякото и зъбите на кърмачето не е твърде продължителен или прекалено чест, понеже това увеличава вероятността от развитие на кариес. Винаги четкайте зъбите на кърмачето след последното нощно хранене.

Дозировка

Възраст на кърмачето (месеци)	6-12
Брой хранения на ден	3*
Брой лъжици за приготвяне на едно хранене	7
Количество вода (ml)	210

* Като част от разнообразен хранителен режим

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,3 g Novalac 2. Разтворете една лъжица в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен ако лекарят, не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

- Винаги приготвяйте храната непосредствено преди хранене.
- Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина.
- Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия.
- След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици. Затваряйте кутията плътно след употреба.
- Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.
- Опаковано при контролирани атмосферни условия.
- Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария
- Официален представител за България: Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул., Проф. Атанас Иширков" 31







800 g C

Хранителна стойност

		100 g	100 ml
Енергийна стойност	kJ	2115	275
	kcal	505	66
Мазнини	g	25	3,3
От които			
- наситени	g	11,6	1,5
- Линолова киселина	g	4,6	0,6
- Алфа-линоленова киселина	mg	410	53
- DHA (Докозахексаенова киселина)	mg	120	16
Въглехидрати	g	60	7,8
- От които захари	g	42	5,5
Белтъци	g	9,5	1,2
Витамини			
Витамин А	μд	440	57
Витамин D	μд	12	1,6
Витамин Е	mg	8	1
Витамин К	μд	60	7,8
Витамин С	mg	60	7,8
Витамин В1 (Тиамин)	mg	0,8	0,10
Витамин В2 (Рибофлавин)	mg	1,05	0,1
Ниацин	mg	4,5	0,6
Витамин Вб	mg	0,5	0,07
Фолиева киселина	μд	110	14
Фолат	μg-DFE	190	25
Витамин В12	μд	1,5	0,2
Биотин	μд	18	2,3
Пантотенова киселина	mg	5	0,7
Минерали			
Натрий	mg	165	21
Калий	mg	600	78
Хлорид	mg	390	51
Калций	mg	500	65
Фосфор	mg	300	39
Магнезий	mg	45	5,9
Желязо	mg	7,8	1
Цинк	mg	3,7	0,5
Мед	mg	0,38	0,05
Манган	mg	0,045	0,006
Флуорид	mg	<0,45	<0,06
Селен	μg	25	3,3
Йод	μд	95	12
L-карнитин	mq	20	2,6

Съставки

Обезмаслено мляко, малтодекстрини, растителни масла (палмово, соево, кокосово), млечни протеини, лактоза, калциеви соли на лимонена киселина, рибено масло (DHA) (мляко), калциев хлорид, калиеви соли на лимонена киселина, емулгатор (соев лецитин), натриева сол на ортофосфорна киселина, калциева сол на ортофосфорна киселина, L-фенилаланин, витамини (аскорбинова киселина, натриев-L-аскорбат, dl-алфа токоферол ацетат, калциев d-пантотенат, никотинамид, тиамин хидрохлорид, рибофлавин, ретинил ацетат, пиридоксин хидрохлорид, фолиева киселина, фитоменадион, холекалциферол, d-биотин, цианокобаламин), магнезиеви соли на лимонена киселина, L-триптофан, L-изолевцин, железен сулфат, L-цистин, L-тирозин, L-карнитин, L-левцин, натриев хлорид, цинков сулфат, антиоксиданти (екстракт, богат на токофероли), натриев селенит, меден сулфат, калиев йодид, манганов

Инструкции за приготвяне

МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНЕ.



1 Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с биберона във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути.




малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5

Преварете водата за приготвянето на храната в



З Охладете водата в съда до 40 °С и я налейте в







6 Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.

Tin size: 127x153 mm

M-offset label specification 600g/800g: 412,7x143,5 mm

Colors: Cut Magenta Yellow Pantone 288 Pantone 2727