

Употреба

Novalac 3 мляко за малки деца е подходящо за деца от 1 и 3-годишна възраст. Една доза съдържа калций и витамин D (необходими за нормалния растеж и развитие на костите при децата), желязо (допринася за нормалното когнитивно развитие на децата) и йод (допринася за нормалния растеж на децата). Novalac 3 мляко за малки деца е източник на витамини A, B1, B2, C, D и биотин и е богато на витамини B12 и K1. Novalac 3 е подходящо за продължително хранене след употреба на преходното мляко Novalac 2 или друго преходно мляко. Има приятен вкус на ванилия.

Дозировка

Можете да давате на детето си Novalac 3 мляко за малки деца, топло (<37°C) или студено, или да го изпизвате за приготвяне на зърнени каши и други храни като част от балансиран хранителен режим. Една кутия от 400 g е достатъчна за 11 хранения. Приготвяне в шише: На всеки 30 ml вода добавяйте една мерителна лъжица от Novalac 3. Пълна догоре и изравнена мерителна лъжица от опаковката съдържа 4,5 g от млякото за малки деца Novalac 3. За 100 ml готова храна изсипете в шише 3 равни мерителни лъжици Novalac 3 (15 g). Приготвяне в чашка: В 240 ml вода изсипете 8 мерителни лъжици Novalac 3.

- Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене.
 - Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина.
 - Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия.
 - След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици.
 - Затваряйте кутията плътно след всяка употреба.
 - Не съхранявайте остатъци от хран. Изхвърлете остатъците.
- Опаковано при контролирани атмосферни условия.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария
Държава на произход: Германия
Официален представител за България: Медис
Фарма България ЕООД, София 1700, ул. „Проф.
Атанас Иширков“ 31

MEDIS | www.novalac.bg



Novalac

3

Мляко за малки деца



1-3 години

400 g e

Novalac

Хранителна стойност

		100 g	100 ml	NRV
Енергийна стойност	kJ	1990	269	/
	kcal	474	64	/
Мазнини	g	19	2,6	/
- От които наситени	g	7,6	1	/
- линолова киселина	g	4,4	0,6	/
- алфа-линоленова киселина	mg	530	7,2	/
Въглехидрати	g	64,4	8,7	/
- От които захари	g	38,2	5,2	/
Белтъци	g	11	1,5	/
Сол	g	0,325	0,04	/
Витамини				
Витамин A	µg RE	540	73	18%
Витамин D3	µg	8,5	1,1	16%
Витамин E	mg α-TE	4	0,5	/
Витамин K1	µg	30	4,1	34%
Витамин C	mg	60	8,1	18%
Витамин B1 (Тиамин)	mg	0,6	0,08	16%
Витамин B2 (Рибофлавин)	mg	1	0,14	20%
Витамин B3 (Ниацин)	mg	6	0,8	/
Витамин B6	mg	0,7	0,09	/
Фолиева киселина	µg	120	16	21%
Витамин B12	µg	2	0,3	38%
Биотин	µg	20	2,7	27%
Пантотенова киселина	mg	2,5	0,3	/
Минерали				
Калций	mg	650	88	16%
Фосфор	mg	385	52	/
Магнезий	mg	45	6,1	/
Желязо	mg	9,5	1,3	16%
Цинк	mg	4	0,5	/
Мед	mg	0,35	0,05	/
Манган	mg	0,035	0,005	/
Йод	µg	100	14	18%

* NRV (хранителни референтни стойности)

Съставки

Частично обезмаслено мляко, малтодекстрини, лактоза, растителни масла (палмово, соево, кокосово, рапично масло), фруктоза, декстроза, трикалциев цитрат, трикалциев фосфат, витамини [Аскорбинова киселина (витамин C), никотинамид (ниацин), DL-алфа токоферол ацетат (витамин E), калциев D-пантотенат, рибофлавин, тиамин хидрохлорид, ретинил ацетат (витамин A), пиридоксин хидрохлорид (витамин B6), фолиева киселина, D-биотин, фитоменадион (витамин K), колекалциферол (витамин D), цианокобаламин (витамин B12)], етил ванилин, желязен сулфат, магнезиев оксид, цинков сулфат, антиоксиданти (екстракт, богат на токоферол), меден сулфат, калиев йодид, манганов сулфат.

Инструкции за приготвяне



МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНО.



1 Стерилизирайте шишето и капачката с бибера (или чашката) във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



2 Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



3 Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето.



В кутията е включена и мерителна лъжица. Сложете препоръчания брой лъжици от млякото за кърмачета в шишето или чашката.



5 Затворете шишето и го разклатете добре, така че съдържанието да се разтвори изцяло.



6 Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.

Novalac 3 може да се използва като заместител на приготвяното дневно млечно меню.