

Употреба

Novalac AR Digest + е храна, специално разработена, за да отговори на хранителните нужди на бебета с регургитация. Novalac AR Digest + може да се използва като единствен източник на хранене, докато бебето навърши 6 месеца, ако те не са на майчина кърма. След 6-месечна възраст можете да използвате Novalac AR Digest + като част от разнообразна диета, която трябва постепенно да въвеждате съобразно съветите на вашия лекар. Novalac AR Digest + е съгласна формула, специално разработена, за да отговори на хранителните нужди на бебета с регургитация и гастро-езофагеален рефлукс. Novalac AR Digest + съдържа уникална смес от съставки, която комбинира свойствата на нишесте и хранителни влакнини за намаляване на регургитацията.

Важна забележка

Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета. Използвайте Novalac AR Digest + само под лекарско наблюдение и само при бебета, които проявяват симптомите, за които продуктът е предназначен. Не използвайте продукта като единствен източник на храна след 6-месечна възраст. Когато се използва мляко за кърмачета Novalac AR Digest +, е необходимо специално внимание при кърмачета с отслабен имунен отговор, недоносени кърмачета и новородени с ниско телесно тегло при раждане и в случай на алергични реакции към белтъците на млякото. Неправилното приготвяне или съхранение може да представлява риск за здравето. Novalac AR Digest + не е подходящ за парентерална употреба или за хранене през тръба. Опаковано при контролирани атмосферни условия.

Дозировка

Възраст на кърмачето (месеци)	0-1	1-2	2-4	4-6	6-12	12-36
Брой хранения на ден	6	5	5	4	3*	2*-3*
Брой лъжици за приготвяне на едно хранене	3	4	5	7	7	8
Количество вода (ml)	90	120	150	210	210	240

* като част от разнообразното хранене

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжичка от опаковката съдържа 4,3 g Novalac AR Digest +. Разтворете една лъжичка в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето. Освен, ако лекарят не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

Поради специфичния състав може да се наложи да разклащате повече от обикновено, за да разтворите Novalac AR Digest +. Без никакви последствия за вашето дете, съгласената формула Novalac AR Digest + естествено може да съдържа малки тъмни частици от растителен производ (рожково брашно) и/или малки бели бучки от хранителни влакнини.

Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене.
• Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина.
• Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на металната кутия. • След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици. Затваряйте кутията плътно след употреба. • Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария • Произведени в ЕС • Официален представител за България: Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширов“ 31



MEDIS | www.novalac.bg




0-36 месеца

Novalac AR Digest +

Храна за специални
медицински цели

За диетотерапия
при регургитация



400 g e

Хранителна стойност

	100 g	100 ml
Енергийна стойност		
	kJ	2097 273
	kcal	501 65
Мазнини		
От които	g	25,1 3,3
- наситени	g	11,2 1,5
- Диниолова киселина	g	4,5 0,6
- Алфа-линоленова киселина	mg	405 53
- DHA (Докозахеасенова киселина)	mg	120 16
- ARA (Арахидонова киселина)	mg	30 4
Въглехидрати		
От които	g	57,2 7,4
- захари	g	30,3 3,9
- нишесте	g	1 0,1
Фибри		
Белтъци	g	10,4 1,4
Сол	g	0,475 0,06
Витамини		
Витамин А	µg RE	425 55
Витамин D	µg	11,5 1,5
Витамин E	mg	8,7 1,1
Витамин K	µg	60 7,8
Витамин C	mg	65 8,5
Витамин B1 (Тиамин)	mg	0,8 0,10
Витамин B2 (Рибофлавин)	mg	1,2 0,2
Ниацин	mg	4,5 0,6
Витамин B6	mg	0,5 0,07
Фолиева киселина	µg	85 11
Фолат	µg DFE	155 20
Витамин B12	µg	1,5 0,2
Биотин	µg	18 2,3
Пантотенова киселина	mg	4,9 0,6
Минерали		
Натрий	mg	190 25
Калий	mg	590 77
Хлорид	mg	445 58
Калций	mg	525 68
Фосфор	mg	335 44
Магнезий	mg	53 6,9
Желязо	mg	5,3 0,7
Цинк	mg	4 0,5
Мед	mg	0,38 0,05
Манган	mg	0,041 0,005
Флуорид	mg	<0,45 <0,06
Селен	µg	22 2,9
Хром	µg	<45 <5,9
Молибден	µg	<45 <5,9
Йод	µg	95 12
Лактан	mg	170 22
Инозитол	mg	80 10,4
Таурин	mg	40 5,2
L-карнитин	mg	20 2,6

Съставки

Обезмаслено мляко, малтодекстрин, растителни масла [палмово, соево, кокосово], лактоза (мляко), съставки [пектин, брашно от рожков], нишесте от талиока, рибеино масло (DHA) (мляко), емулгатор [соев лецитин], трикалциев цитрат, холин битартрат, калциев хлорид, магнезиев хлорид, витамини [аскорбинова киселина (витамин C), натриев аскорбат (витамин C), DL-алфа-токоферил ацетат (витамин E), никотинамид (ниацин), калциев D-пантотенат, тиамин хидрохлорид, рибофлавин, ретинол ацетат (витамин A), пиридоксин хидрохлорид (витамин B6), фолиева киселина, фитомедадион (витамин K), D-биотин, холекалциферол (витамин D), цианокобаламин (витамин B12)], L-цистин, инозитол, масло от Mortierella alpina (ARA) (мляко), дипотасиев фосфат, L-триптофан, таурин, тринатриев цитрат, динатриев фосфат, железен сулфат, L-карнитин, цинков сулфат, тримагнезиев цитрат, антиоксиданти [екстракт, богат на токоферол], натриев селенит, меден сулфат, калиев йодид, манганов сулфат.

Инструкции за приготвяне



МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕНЕ.



1 Стерилизирайте бебешкото шише и капачката с биберона във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



2 Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



3 Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето.



4 С приложената в кутията мерителна лъжичка, сложете препоръчания брой лъжици от млякото за кърмачета или малкото дете в шишето.



5 Затворете шишето и го разклащайте добре, така че прахообразната съставка да се разтвори изцяло.



6 Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.