

## ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ

|                                   | 100 g    | 100 ml      |
|-----------------------------------|----------|-------------|
| <b>Енергийна стойност</b>         |          |             |
|                                   | kJ       | 2106        |
|                                   | kcal     | 503         |
| <b>Мазнини</b>                    | <b>g</b> | <b>26,2</b> |
| - от които наситени               | g        | 10,2        |
| - Линолова киселина               | g        | 4,7         |
| - Алфа-линоленова киселина        | mg       | 430         |
| - DHA (Докозахексаенова киселина) | mg       | 120         |
| - ARA (Арахидонова киселина)      | mg       | 30          |
| <b>Въглеhidрати</b>               | <b>g</b> | <b>53,5</b> |
| - от които захари                 | g        | 4,7         |
| - от които нишесте                | g        | 1           |
| <b>Фибри</b>                      | <b>g</b> | <b>2</b>    |
| <b>Белтъци</b>                    | <b>g</b> | <b>12,1</b> |
| <b>Сол</b>                        | <b>g</b> | <b>0,45</b> |
| <b>Витамини</b>                   |          |             |
| Витамин A                         | µg       | 440         |
| Витамин D                         | µg       | 12          |
| Витамин E                         | mg       | 8,7         |
| Витамин K                         | µg       | 30          |
| Витамин C                         | mg       | 60          |
| Витамин B1 (Тиамин)               | mg       | 0,8         |
| Витамин B2 (Рибофлавин)           | mg       | 1,2         |
| Ниацин                            | mg       | 4,5         |
| Витамин B6                        | mg       | 0,6         |
| Фолиева киселина                  | µg       | 100         |
| Фолат                             | µg-DFE   | 170         |
| Витамин B12                       | µg       | 1,5         |
| Биотин                            | µg       | 15          |
| Пантотенова киселина              | mg       | 5           |
| <b>Минерали</b>                   |          |             |
| Натрий                            | mg       | 180         |
| Калий                             | mg       | 610         |
| Хлорид                            | mg       | 400         |
| Калций                            | mg       | 575         |
| Осфор                             | mg       | 330         |
| Магнезий                          | mg       | 50          |
| Желязо                            | mg       | 5,4         |
| Цинк                              | mg       | 3,5         |
| Мед                               | mg       | 0,38        |
| Манган                            | mg       | 0,05        |
| Флуорид                           | mg       | <0,45       |
| Селен                             | µg       | 22          |
| Хром                              | µg       | <45         |
| Молибден                          | µg       | <45         |
| Йод                               | µg       | 100         |
| Холин                             | mg       | 170         |
| Инозитол                          | mg       | 80          |
| Таурин                            | mg       | 40          |
| L-карнитин                        | mg       | 20          |

## Инструкции за приготвяне



**МИЙТЕ РЪЦЕТЕ СИ ВСЕКИ ПЪТ ПРЕДИ ПРИГОТВЯНЕТО НА ВСЯКО ХРАНЕ.**



**1** Стерилизирате бебешкото шише и капачката с бибера на във вряща вода. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



**2** Преварете водата за приготвянето на храната в малък покрит съд. Оставете я да ври най-малко 5 минути.



**3** Охладете водата в съда до 40 °C и я налейте в шишето.



**4** С приложената в кутията мерителна лъжица сложете препоръчания брой лъжици от млкото за кърмачета или малкото дете в шишето.



**5** Затворете шишето и го разклатете добре, така че прахообразната съставка да се разтвори изцяло.



**6** Охладете приготвената храна до умерена температура (37 °C) или докогато същата не е нито топла, нито студена при допир.

Novalac Allernova AR е съгласна формула и може да се наложи допълнително разклащане преди употреба, за да се разтвори. Поради специалната структура, нейният външен вид, мирис и вкус в шишето за хранене може да се различава от тези на стандартното мляко. Може също така да доведе до по-малко твърди и/или зеленикави изпражнения без дискомфорт за кърмачето или малкото дете.

200008728



# Novalac Allernova AR



**Храна за специални медицински цели**

**За диетотерапия при кърмачета и малки деца, алергични към белтъците на кравето мляко, с или без регургитация**

Без лактоза



**0-36** месеца

**400 g e**

## ДОЗИРОВКА

| Възраст на кърмачето или малкото дете (месеци) | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 4-6 | 6-12 | 12-36 |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Брой хранения на ден                           | 6   | 5   | 5   | 4   | 3*   | 2*3*  |
| Брой лъжици за приготвяне на едно хранене      | 3   | 4   | 5   | 7   | 7    | 8     |
| Количество вода (ml)                           | 90  | 120 | 150 | 210 | 210  | 240   |

\* като част от разнообразното хранене

Пълна догоре и изравнена мерителна лъжица от опаковката съдържа 4,5 g Novalac Allernova AR. Разтворете една лъжица в 30 ml вода. Коригирайте дневния прием на храна и броя хранения спрямо възрастта и нуждите на кърмачето или малкото дете. Освен, ако лекарят не препоръча друго, следвайте препоръките в таблицата.

Винаги пригответе храната непосредствено преди хранене. Съхранявайте на сухо място, далеч от топлина и светлина. Продуктът е годен за употреба преди датата, отпечатана на дъното на кутията. След отваряне съдържанието на кутията трябва да се използва в срок до три седмици. Затваряйте кутията плътно след употреба. Не използвайте остатъчното количество мляко. Изхвърлете остатъците.

## СЪСТАВКИ

Малтодекстрин, растителни масла [палмово, рапично, слънчогледово, кокосово], хидролизат на млечни протеини, състители [пектин, ксантанова гума, рожковена гума], нишесте от тапиока, дикалциев фосфат, емулгатор [сплънчогледов лецитин], трикалциев цитрат, калциев хлорид, магнезиев хлорид, холинов битартрат, масло от микрорододрасли Schizochytrium sp. (DHA), L-цистин, витамини [аскорбинова киселина (витамин C), DL-алфа-токоферил ацетат (витамин E), калциев D-пантотенат, никотинамид (ниацин), рибофлавин, тиамин хидрохлорид, пиридоксин хидрохлорид (витамин B6), ретинил ацетат (витамин A), фолиева киселина, фитоменадион (витамин K), D-биотин, холекалциферол (витамин D), цианкобаламин (витамин B12)], L-триптофан, инозитол, железен пиродифосфат, масло от Mortierella alpina (APA), дикалциев фосфат, трикалциев цитрат, таурин, L-хистидин, L-фенилаланин, L-карнитин, L-тирозин, L-изолеуцин, тринатриев цитрат, цинков сулфат, антиоксиданти [екстракт, богат на токоферол, аскорбил палмитат], натриев селенит, меден сулфат, калиев йодид, манганов сулфат.

## Употреба

Novalac Allernova AR е храна за специални медицински цели, която съдържа хидролизирани белтък от краве мляко (казеин) и е подходяща за кърмачета и малки деца, свръхчувствителни към белтъка на кравето мляко, с или без регургитация. Novalac Allernova AR съдържа уникална смес от състители, съчетаваща качествата на нишестето и диетичните влакнини. Novalac Allernova AR е подходяща за кърмачета и малки деца от раждането до 36-месечна възраст, ако същите не са кърмени. До шестмесечна възраст може да се използва като единствена храна, от шест месеца нататък и по лекарска препоръка може да се използва като част от разнообразния хранителен режим. Не въвеждайте други млечни храни (бебешка каша с мляко, млечни продукти) в диетата на детето си без първо да се консултирате с лекар. Novalac Allernova AR не съдържа лактоза и глютен.

## Важна забележка

**Майчиното мляко е най-добрата храна за кърмачета.** Използвайте Novalac Allernova AR само под лекарско наблюдение и само при бебета, които проявяват симптомите, за които продуктът е предназначен. Не използвайте продукта като единствен източник на храна след 6-месечна възраст. Novalac Allernova AR не трябва да се използва в случай на малабсорбция на глюкоза и галактоза. Когато се използва мляко за кърмачета Novalac Allernova AR, е необходимо специално внимание при кърмачета с отслабен имунен отговор, недоносени кърмачета и новородени с ниско телесно тегло. Неправилното приготвяне или съхранение може да представлява риск за здравето. Novalac Allernova AR не е подходящ за парентерална употреба или за хранене през тръба. Опаковано при контролирани атмосферни условия.

Фирмено седалище: UP Medi-Europa SA, Швейцария

• Произведени в ЕС.

• Официален представител за България: Медис Фарма България ЕООД, София 1700, ул. „Проф. Атанас Иширков“ 31

**MEDIS**  
www.novalac.bg